복합운동이 유방암 환자의 건강관련 체력과 혈중 렙틴 및 인슐린 농도의 변화에 미치는 영향

이청무 · 김수미* · 나선영 · 이난희
숙명여자대학교

Abstract

초 록

Lee, Chung-Moo, Kim, Su-Mi, Na, Sun-Young, Lee, Nan-Hee. The Effects of Combined exercise training for breast cancer survivors in Health related fitness, Leptin and Insulin.

The purpose of this study was examine the effects of combined exercise training on health related fitness, leptin and insulin concentrations in breast cancer patients. Twenty sedentary, breast cancer survivors were randomly assigned either to a 12-week cardiovascular and elastic band strength training exercise intervention(3days/week) or to a usual care control group. Fasting leptin and insulin levels, body composition, harvard step, sit and reach, grip strength and sit up were collected at baseline and 12 weeks. The exercise group experienced significant increases in LBM ($p<.05$), cardiorespiratory endurance($p<.01$), flexibility($p<.05$) and muscle endurance($p<.01$), but no significant changes in the control group. There was significant differences between groups in cardiorespiratory endurance($p<.05$), flexibility($p<.001$), and muscle endurance($p<.001$). Fasting leptin concentrations decreased in the exercise group($p<.01$), with no significant change in the control group and the comparison reached statistical significance($p<.01$) between groups. Insulin concentrations decreased in the exercise group($p<.05$), with no significant change in the control group and the comparison reached statistical significance($p<.05$) between groups. Participation in an exercise intervention was associated with a significant decrease in leptin and insulin levels and increase in health related fitness in breast cancer survivors. The cardiovascular and elastic band exercise program for breast cancer survivors may be mediated, in part, through changes in leptin and insulin levels and/or changes in body fat or fat deposition.

Key words : breast cancer, Combined exercise, health related fitness, leptin, insulin.

이청무·김수미·나선영·이난희 복합운동이 유방암 환자의 건강관련 체력과 혈중 렙틴 및 인슐린 농도의 변화에 미치는 영향

본 연구는 복합운동이 유방암 환자들의 건강관련 체력과 렙틴 및 인슐린 농도의 변화에 미치는 영향을 분석하여 이들의 비만 예방과 개선 및 암 재발을 방지하고 나아가서는 건강한 삶을 영위하기 위한 운동 프로그램의 기초 자료를 제공하는데 그 목적이 있다. 총 20명의 유방암 환자(운동군: 10명, 통제군: 10명)를 대상으로 운동군의 경우 12주간 운동을 가미한 유산소운동과 탄력밴드를 이용한 근력운동으로 구성된 복합운동을 주 3회 실시하였으며 통제군은 12주간 일상생활을 유지하도록 하였다. 12주 운동 전 후의 차이를 분석한 결과 운동군의 경우 체지방량($p<.05$), 심폐지구력($p<.01$), 유연성($p<.05$), 근지구력($p<.01$)이 유의하게 증가하였고, 렙틴($p<.001$)과 인슐린($p<.05$) 농도가 유의하게 감소하였으나 통제군은 유의한 차이가 나타나지 않았다. 그리고 운동군과 통제군간의 집단간 차이를 검정한 결과 심폐지구력($p<.05$), 유연성($p<.001$), 근지구력($p<.001$), 렙틴($p<.01$) 그리고 인슐린($p<.05$)의 농도에 있어서 유의한 차이가 나타났다. 따라서 본 연구에서 실시한 12주간의 복합운동은 유방암 환자의 건강관련 체력과 렙틴 및 인슐린 농도의 변화에 긍정적인 영향을 미쳐 유방암 환자에게 비만 예방과 개선 및 암의 재발을 방지하고 나아가 이들의 건강 유지·증진 및 삶의 질 향상을 위한 운동 프로그램의 기초자료로 유용하게 사용될 수 있을 것이라 사료된다.

주요어 : 유방암, 복합운동, 건강관련 체력, 렙틴, 인슐린

* 김수미, 숙명여자대학교, E-mail : k9701222@hanmail.net

본 연구는 2008년도 과학기술부 우수연구센터 육성사업의 지원으로 수행되었음(여성질환연구센터)

I. 서론

유방암은 우리나라 여성 암 발생률 중 1위(7.4 %)를 차지하고 있으며(보건복지부, 2007), 60 % 이상이 50세 이하로 선진국에 비해 연령이 낮다는 점과 5년 생존률이 83.5 %로 높다는 점에서(국립 암 센터, 2007) 유방암 환자들의 삶의 질을 향상시키기 위한 신체적, 정신적 측면에서의 다양한 연구들이 이루어지고 있다. 이러한 연구들에 의하면 유방암은 비만과 관련성이 높아(이동현, 2007) 유방암 예방 및 재발 방지를 위해서는 신체활동을 통해 비만을 해소하는 것이 건강한 삶을 영위하는데 도움을 줄 수 있다고 한다.

암, 심혈관질환, 당뇨병은 비만, 신체 활동 부족, 흡연 등 공통의 위험인자를 가지고 있어 서로 일치하는 부분이 많은 것으로 알려지고 있다(Calle & Kaaks, 2004; Komninou et al., 2003; Renehan & Howell, 2005). 특히 비만하면 인슐린 저항성이 발생되고 지방세포에서 분비되는 렙틴의 양이 증가하는데 만성적으로 체내 렙틴 농도가 높아지게 되면 렙틴 저항성이 발생하며 인슐린 저항성을 증가시켜 고인슐린 혈증이 발생하게 된다.

과거에는 단순한 지방 저장 장소로만 여겨졌던 지방세포가 adiponectin, leptin, resistin, TNF- α , interleukin-6 등 다양한 물질을 분비하는 내분비 기관으로 밝혀지면서 이들의 생체 내 기능 및 그 역할을 규명하여 비만 및 이와 관련된 대사 질환의 이해에 대한 연구들이 이루어지고 있다(김종엽 등, 2005).

지방세포에서 분비되는 물질 중 렙틴은 식욕을 억제시키고 포만감을 느끼게 하는 식욕과 에너지 대사 조절 호르몬으로 인슐린 저항성과 직접적인 관련이 있으며(Boden et al., 1997; Kolacynski et al., 1996; Haffner et al., 1996), 체지방량과도 밀접한 관련이 있다(Hassink et al., 1996; Considine et al., 1996; Kellerer et al., 2001). 유방암과 관련된 렙틴은 대부분의 연구에서 폐경 후 여성에게는 유방암 발생 위험요인으로 작용한다(Rose et al., 2002). O'Brien et al.(1999)은 렙틴이 유방의 상피세포 종양에서 발견되었다고 하였고, Han et al.(2005)은 렙틴이 폐경 유무와 관계없이 유방암과 관련이 있다고 보고하였다. 또한 렙틴은 인슐린과 같은 내분비 요소들과 상호 관련이 있어 증가된 인슐린 분비로 인한 체지방의 증가 및 인슐린 감수성 감소와도 관련된다(Niskanen et al., 1997).

인슐린은 체지방량 이외에 렙틴 농도에 영향을 주는 인자로(Boden et al., 1997; Kolacynski et al., 1996; Haffner et al., 1996), 렙틴 생산을 증가시키며 체지방량과 무관하게 렙틴 농도를 조절하는 인자로 알려지고 있다(Cusin et al., 1995). 암과 관련하여 비만으로 인한 인슐린 저항성의 증가로 발생하는 만성 고인슐린혈증은 대장암, 췌장암, 자궁내막암 그리고 부분적으로 유방암의 발생기전과 관계되는 것으로 보고되고 있다(Kaaks, 1996; Giovannucci, 1995; Weiderpass et al., 1998; Kaaks et al., 2002). 유방암과 관련하여 인슐린은 유방세포들의 분열을 촉진하는 효과를 가지고 있어(Belfiore et al., 1996; Papa & Belfiore, 1996), 고농도의 인슐린은 유방암 환자의 예후에 악영향을 미치는 것과 관계되므로(Goodwin et al., 2002) 유방암 생존자에 있어 인슐린 농도를 정상화 하는 것은 종양의 성장 지연과 관계된다(McTiernan, 2004).

대부분의 선행 연구에서 규칙적인 신체활동은 렙틴의 합성과 분비를 직접적으로 감소시키고(Hickey et al., 1997), 비만인들의 인슐린 농도를 감소시키는 것으로 보고되고 있다(Kelley & Goodpaster, 1999). Irwin et al.(2005)은 신체활동을 높이고 체지방을 감소시키는 것이 인슐린과 렙틴의 변화를 일으키는 의미 있는 중재이며, 유방암의 예후에도 잠재적인 영향을 미친다고 하여, 신체활동을 높이는 것은 유방암의 위험을 감소시켜 줄 뿐만 아니라 인슐린과 렙틴에 긍정적인 변화를 주는 것을 알 수 있다. McTiernan et al.(1998)은 40~74세 사이의 유방암 1~2기 생존자를 대상으로 8주간 운동-식이요법 중재를 통해 체중감량, 허리·엉덩이 둘레 및 체지방 감소, 체지방량 증가 등의 결과를 가져왔다고 보고하고 있으며, Winningham et al.(1989)은 보조적 화학 요법을 받는 유방암 2기 환자들을 대상으로 10~12주 동안 유산소 운동 관리 프로그램의 실시가 운동그룹의 비만 또는 비만하지 않은 환자 모두에서 체지방과 피하지방을 줄이는데 효과적인 것으로 나타났다고 보고하였다.

일반인을 대상으로 근력 운동과 유산소 운동을 실시한 선행연구들 대부분에서 운동은 인슐린 농도를 유의하게 감소시키고, 인슐린 민감성은 유의하게 상승시키는 것으로 보고되고 있다(Miller et al., 1994; Kirwan et al., 1993; Craig et al., 1989). 그러나 암 진단 이후 많은 스트레스와 수술 후 항암치료와 화학요법 및 방사선 치료 기간 등을 거치는 동안에 저하된 체력과 체중이 증가된 유방암 생존자를 대상으

로 장기간의 복합운동을 통한 체력과 렵틴 및 인슐린의 농도 변화에 관한 연구는 매우 부족한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 12주간의 유산소 운동과 탄력밴드를 이용한 근력운동으로 구성된 복합운동프로그램이 유방암 환자의 건강관련 체력과 렵틴 및 인슐린 농도의 변화에 미치는 영향을 분석하여 이들의 비만 예방과 개선 및 암 재발을 방지하고 나아가서는 건강한 삶을 영위하기 위한 운동 프로그램의 기초 자료를 제공하고자 한다.

II. 연구방법

1. 연구대상

본 연구의 대상자는 경기도 소재 A 시 H병원의 유방·내분비센터에서 유방암 수술과 방사선 요법이 종료된 환자로 담당의사의 동의를 얻은 후에 연구의 목적 및 절차를 이해하고 연구 참여에 동의한 자, 병기 I~III기인 유방암 환자로서 수술을 받은 지 6개월 이상 2년 이내의 환자를 대상으로 하였다. 이들 중 심혈관질환, 급·만성 폐질환, 당뇨병, 기동장애 등의 전신질환이 없는 환자, 그리고 규칙적으로 운동을 하고 있지 않은 환자 20명 중 운동군 10명과 통제군 10명을 무작위로 선정하였으며 신체적 특성은 Table 1과 같다.

Table 1. Physical characteristics of Subjects

Group	BG(n=10)	CG(n=10)
Age(years)	47.90±4.51	52.90±7.50
Height(cm)	156.90±5.69	158.60±4.40
Weight(kg)	59.96±8.12	58.03±9.32
%Fat(%)	33.06±2.12	29.80±5.69

Values are Mean±SD, BG: exercise group, CG: control group

Table 2. Exercise Program

Stage	Week	Rhythmic exercise		Band exercise		Exercise frequency (sessions/week)
		Exercise duration (min)	Exercise intensity (%HRR)	Type	Set /Repetition	
I	1~2	15~20	40~50	Upper body : biceps curl, triceps extension, overhead pull-down,	1~2/10~12	3
	3~4	20~25	50~60	lateral shoulder raises, overhead press, chest press,	1~2/10~12	
II	5~6	25~30	60~70	shoulder shrugs, butter fly	2~3/10~12	
	7~8	25~30	60~70	Abs : side band, sit up	2~3/10~12	
III	9~10	30~35	65~75	Lower Body : squat, lunge, leg raises(seat, prone, side, knee-	3/12~15	
	11~12	30~35	65~75	band), dead lift	3/12~15	

2. 운동프로그램

본 연구에서 실시한 운동 프로그램은 Table 2와 같이 유산소운동과 밴드운동으로 주 3회, 12주간 복합 운동을 실시하였다. 유산소 운동은 음악에 맞춰 구성되어진 맨손 체조 작품들이 실시되었으며 운동 강도는 HRR의 40~75 %로 실시하였고, 저항성 운동은 탄력밴드를 이용하여 10~15 회 반복을 1~3 세트 실시하였다. 운동시간은 준비운동 5~10 분, 본 운동 35~45 분(유산소 운동 : 15~35분, 밴드운동 : 10~20분), 정리운동 5~10 분 동안 실시하였으며, 적정 운동 강도의 유지를 위한 음악의 템포는 준비운동과 정리운동 단계에서 100~120 bpm으로 하고, 본 운동 단계에서 130~160 bpm의 음악을 사용하였다.

본 운동 시 운동 강도의 점진적 증가에 따라 개인별 목표 심박수를 확인할 수 있도록 원격 심박수계 Polar(sports tester, Finland)를 착용하여 운동을 수행하였으며, 운동 강도가 같은 단계에서는 대상자가 운동자각도(Rating Perceived Exertion, RPE) 11~14의 범위 내에서 본인의 운동 강도를 유지할 수 있도록 하였다. 목표 심박수의 산출은 최대 심박수(220-연령)를 이용한 일반적인 공식인 [목표심박수(THR) = (최대 심박수 - 안정시 심박수) × 운동강도 + 안정시 심박수]로 계산하였다.

3. 측정항목 및 방법

1) 건강관련 체력

신체조성은 다주파수 부위별 방식의 생체전기 저항법(bio electrical impedance, In-body 3.0, Biospace Co., Korea)을 이용하여 신장(cm), 체중(kg), 제지방량(kg), 체지방률(%)을 측정하였고, 심폐지구력의 측정은 간접측정방법으로 많이

사용되는 한국형 스텝 테스트(Step Test)로 측정하였는데, 피험자는 높이 30cm의 승강대에서 1분간에 26회의 승강운동을 5분 동안 실시하여 운동이 끝난 직후 1분에서 1분 30초, 2분에서 2분 30초, 3분에서 3분 30초의 맥박수를 기록하고, $PEI = [300/2 \times (3\text{회 맥박수의 총합})] \times 100$ 의 공식으로 신체효율지수(PEI; physical efficiency index)를 산출하였다.

유연성은 벽에 등과 머리를 붙이고 다리를 완전히 편 상태에서 sit-and-reach box에 발바닥을 붙이게 한 후 앞으로 밀어내어 마지막 자세를 2초간 유지시킨 후 측정하여 cm단위로 기록하였고, 2회 측정하여 우수한 기록을 사용하였다.

근지구력은 무릎을 90도 각도로 하여 양쪽 팔꿈치가 무릎에 닿게 한 후 다시 누는 동작의 윗몸일으키기를 30초 동안 실시하여 그 횟수를 기록하였다.

근력은 악력계(TAKEI, T.K.K., JAPAN)를 이용하여 0.1kg 단위로 양손을 측정하였으며, 양손 중 높은 기록을 사용하였다.

2) 채혈 및 분석방법

채혈은 12시간 이상의 공복상태로 하여 다음날 오전 8~10시 사이에 실시하였고, 연구대상자들은 채혈 일주일 전부터 식사, 수면, 일상생활을 평상시와 같도록 하였으며, 강한 운동과 음주 및 흡연 등을 금지하였다. 렙틴은 Human Leptin RIA kit(LINCO, USA)를 사용하여 Radioimmunoassay(RIA, Competitive method)원리로 분석하였고, 인슐린은 COAT-A-COUNT INSULIN(DPC, USA)를 이용하여 Solid phase radioimmunoassay 원리로 분석하였다.

Table 3. Homogeneity test of general characteristics of subjects

		EG(n = 10)		CG(n = 10)		Total		χ^2	p
		N	%	N	%	N	%		
Age, (yrs)	30~39	1	10	0	0	1	5	2.400	.30
	40~49	6	60	4	40	10	50		
	50~59	3	30	6	60	9	45		
	M±SD	47.90±4.51		52.90±7.50		49.40±4.54			
Education	High school	8	80	8	80	16	80	.000	1.00
	University	2	20	2	20	4	20		
Incomes, (million won)	below 100	1	10	1	10	2	10	3.600	.46
	100~199	2	20	3	30	5	25		
	200~399	6	60	4	40	10	50		
	400~599	0	0	2	20	2	10		
	over 600	1	10	0	0	1	5		
menarche, (yrs)	10~15	6	60	7	70	13	65	2.20	.64
	16~20	4	40	3	30	7	35		
Family history	YES	6	60	7	70	13	65	2.20	.64
	NO	4	40	3	30	7	35		

EG: exercise group, CG: control group

4. 자료처리

실험결과와 자료처리는 SPSS 12.0 통계프로그램을 이용하여 측정항목의 평균(M)과 표준편차(SD)를 산출하였고, 실험결과로 얻은 raw data의 모집단 분포가 정상분포(normality)임을 Kolmogorov-Smirnov(goodness of fit) 검정으로 확인하였다.

운동 전 대상자의 주요 변수별 동질성 검사는 Chi-square test와 독립표본 t-test(independent t-test)를 이용하였고 운동 전·후 집단 내 차이를 검증하기 위해 대응표본 t검정(Paired t-test)을 실시하였으며 운동 후 집단간의 차이 검증은 사전변수를 공변량으로 하여 공분산분석(ANCOVA)을 통해 분석하였다. 모든 통계적 검정수준은 $\alpha=.05$ 로 하였다.

III. 결과

1. 연구대상자의 사전 동질성 검정

1) 운동군과 통제군의 인구통계학적 변인 동질성 검정

연구대상자의 인구통계학적 변인인 연령, 학력, 경제수준, 초경연령, 가족력에 대한 χ^2 검정 결과는 Table 3.과 같이 운동군과 통제군 모두 동질한 것으로 나타났다.

Table 4. Homogeneity test of disease related factors of subjects

		EG(n=10)		CG(n=10)		Total		χ^2	p
		N	%	N	%	N	%		
Stage of cancer	I	4	40	8	80	12	60	3.333	.07
	II	6	60	2	20	8	40		
Type of operation	Mastectomy	6	60	6	60	12	60	.000	1.00
	Breast-conserving treatment	4	40	4	40	8	40		
Treatments	Chemotherapy	5	50	5	50	10	50	1.111	.55
	Radiation	0	0	1	10	1	5		
	Chemotherapy + Radiation	5	50	4	40	9	45		
Time since diagnosis, (months)	below 12	3	30	3	30	6	30	5.667	.23
	12 ~18	2	20	4	40	6	30		
	18 ~24	1	10	3	30	4	20		
	24 ~30	2	20	0	0	2	10		
	30 ~36	2	20	0	0	2	10		

EG: exercise group, CG: control group

Table 5. Homogeneity test of Health related fitness, Leptin and Insulin

		EG	CG	Total	t	p
		M±SD	M±SD	M±SD		
Body composition	Height(cm)	156.90±5.69	158.60±4.40	157.75±5.02	-.748	.464
	Weight(kg)	59.96±8.12	58.03±9.32	58.99±8.57	.494	.628
	LBM(kg)	40.21±5.32	40.21±3.31	40.21±4.31	.000	1.000
	%fat(%)	33.06±2.12	29.80±5.69	31.43±4.50	1.698	.107
PEI		89.67±4.61	86.33±5.56	88.00±5.26	1.460	.161
Flexibility(cm)		14.73±7.63	13.17±7.60	13.95±7.45	.458	.652
Muscle endurance(times)		12.10±3.70	8.50±7.14	10.3±5.83	1.416	.174
Muscle strength(kg)		23.05±3.20	22.07±4.37	22.56±3.76	.572	.574
Leptin(ng/mL)		11.29±4.19	13.30±13.67	12.30±9.89	-.445	.662
Insulin(μU/mL)		8.73±4.26	7.41±10.02	8.07±7.52	.383	.706

EG: exercise group, CG: control group

2) 운동군과 통제군의 질병관련 변인 동질성 검정

연구대상자의 질병관련 변인인 암의 병기, 수술 유형, 치료 방법, 수술 후 경과 기간에 대한 χ^2 검증 결과는 Table 4.와 같이 운동군과 통제군 모두 동질한 것으로 나타났다.

3) 운동군과 통제군의건강관련 체력, 렙틴 및 인슐린의 동질성 검정

연구대상자의 실험 전 결과변수인 신체조성, 렙틴, 인슐린 및 면역에 대한 독립표본 t-test 결과는 Table 5.와 같이 모든 변인에서 두 군 간에 차이가 나타나지 않아 동질한 것으로 나타났다.

2. 건강관련 체력의 변화

유방암 환자 20명을 대상으로 12주간 복합 운동프로그램을

실시한 전·후의 건강관련 체력을 분석한 결과는 Table 6.과 같다.

표에서 보는바와 같이, 체중은 운동군이 59.96±8.12 kg에서 59.91±8.61 kg으로, 통제군은 58.03±9.32 kg에서 58.36±10.06 kg으로 변화하였으나 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았다. 체지방량의 경우 운동군은 40.21±5.32 kg에서 40.98±5.01 kg으로, 통제군은 40.21±3.31 kg에서 41.27±4.20 kg으로 두 군 모두 증가하였으나 운동군에서만 통계적으로 유의한 차이가 나타났다($p<.05$). 체지방률의 경우 운동군은 33.06±2.12 %에서 31.32±3.61 %로, 통제군은 29.80±5.69 %에서 28.58±5.05 %로 두 군 모두 감소하였으나 운동군에서만 통계적으로 유의한 차이가 나타났고($p<.05$) 신체조성은 12주 운동 후 집단간 유의한 차이가 나타나지 않았다.

PEI는 운동군이 사전 89.67±4.61에서 95.80±5.38로 유의하게 증가하였고($p<.01$) 통제군은 86.33±5.56에서 87.04±6.01로 유의한 차이가 나타나지 않았으며, 집단간 차이 검정에 있어서 유의한 차이가 나타났다($p<.05$).

Table 6. The results of paired t-test & ANCOVA for health related fitness

		pre	post	F	p
Weight(kg)	EG	59.96±8.12	59.91±8.61	7.23	.499
	CG	58.03±9.32	58.36±10.06		
LBM(kg)	EG	40.21±5.32	40.98±5.01*	1.59	.854
	CG	40.21±3.31	41.27±4.20		
%fat(%)	EG	33.06±2.12	31.32±3.61*	1.61	.853
	CG	29.80±5.69	28.58±5.05		
PEI	EG	89.67±4.61	95.80±5.38**	4.71	.024
	CG	86.33±5.56	87.04±6.01		
Flexibility(cm)	EG	14.73±7.63	21.83±3.50*	28.83	.000
	CG	13.17±7.60	16.39±5.61		
Muscle endurance (times)	EG	12.10±3.70	17.10±4.31**	21.58	.000
	CG	8.50±7.14	6.60±3.98		
Muscle strength(kg)	EG	23.05±3.20	24.55±3.60	2.49	.113
	CG	22.07±4.37	23.56±4.01		

EG: exercise group, CG: control group * : p<.05, ** : p<.01

유연성은 운동군이 14.73±7.63 cm에서 21.83±3.50 cm로 유의하게 증가하였고(p<.05) 통제군은 13.17±7.60 cm에서 16.39±5.61 cm로 유의한 차이가 나타나지 않았으며, 집단간 차이 검정 결과 유의한 차이가 나타났다(p<.001)

근지구력은 12.10±3.70 회에서 17.10±4.31 회로 유의하게 증가하였고(p<.01) 통제군은 8.50±7.14 회에서 6.60±3.98 회로 유의한 차이가 나타나지 않았으며, 집단간 차이 검정 결과 유의한 차이가 나타났다(p<.001). 근력은 운동군이 23.05±3.20 kg에서 24.55±3.60 kg으로, 통제군은 22.07±4.37 kg에서 23.56±4.01 kg으로 증가하였으나 모두 유의한 차이가 나타나지 않았으며 집단간에도 유의한 차이가 나타나지 않았다.

2. 혈중 렙틴과 인슐린 농도의 변화

Table 7.은 12주 운동 전·후 운동군과 통제군의 렙틴과 인슐린을 분석한 결과이다.

표에서 보는바와 같이, 렙틴은 운동군이 11.29±4.19 ng/mL에서 8.01±3.87 ng/mL로 통계적으로 유의하게 감소(p<.01)하였고, 통제군은 13.30±13.67 ng/mL에서 12.64±14.65 ng/mL로 감소하였지만 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았으며, 집단간 차이 검정 결과 두 집단간 유의한 차이가 나타났다(p<.01).

Table 7. The results of paired t-test & ANCOVA for Leptin and Insulin

		pre	post	F	p
Leptin (ng/mL)	EG	11.29±4.19	8.01±3.87**	7.328	.005
	CG	13.30±13.67	12.64±14.65		
Insulin (μU/mL)	EG	8.73±4.26	5.91±2.84*	5.94	.011
	CG	7.41±10.02	9.05±8.90		

EG: exercise group, CG: control group * : p<.05, ** : p<.01

인슐린은 운동군이 8.73±4.26 μU/mL에서 5.91±2.84 μU/mL로 통계적으로 유의하게 감소(p<.05)하였고, 통제군은 7.41±10.02 μU/mL에서 9.05±8.90 μU/mL로 증가하였으나 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았으며, 집단간 차이 검정 결과 두 집단간 유의한 차이가 나타났다(p<.05).

IV. 논 의

본 연구에서 유방암 환자를 대상으로 12주간 유산소운동과 탄력밴드를 이용한 근력운동을 실시하여 체력과 렙틴 및 인슐린에 미치는 영향을 분석한 결과를 토대로 선행연구와 비교하여 논의하고자 한다.

1. 건강관련 체력의 변화

운동은 인체의 혈액순환 기능, 환기능력, 에너지 균형 유지 능력, 면역기능 등을 향상시키며(Thune & Furberg, 2001), 여성 관련 악성종양들인 유방암, 자궁내막암, 난소암을 비롯한 대장암과 폐암 등에서도 효과가 있다고 하였다(Friedenreich, 2001). 이러한 암의 경우 중증도의 규칙적인 신체활동은 효과적인 항암효과가 있으며, 특히 질병의 초기 단계에서는 더 큰 영향을 준다(Oliveria & Christos, 1997). 유방암 환자의 경우 유방암 수술 후 6개월이 경과한 후에도 팔레를 하거나 무거운 물건을 들 때 불편감이 발생되고, 유방절제술 1년 후 대상자들은 환측 악력이 건축보다 12~18 % 정도 감소하며(Hladiuk et al., 1992), 5.5년이 경과한 유방암 절제술 환자 86명을 대상으로 한 연구에서도 체력의 저하가 장기적으로 지속된다고 보고 하였다(Blanchard et al., 2001). 따라서 이와 같은 연구 결과를 볼 때 유방암 생존자들에게 운동을 통한 체력증진이 필요하며 본 연구의 대상자들도 수술 후 3년이 경과하지 않은 대상자들이기 때문에 적절한 운동 프로그램을 통해 약화된 체력을 증진시킬

필요가 있다고 사료된다.

본 연구에서 유방암 환자를 대상으로 12주간 유산소 운동과 탄력밴드를 이용한 근력 운동을 실시한 결과 운동군의 경우 특히 제지방이 증가하고, 체지방률이 감소하였으며, 심폐지구력, 유연성 및 근지구력이 유의하게 증가하였다.

이러한 결과를 뒷받침 할 수 있는 선행 연구들을 살펴보면 Winningham et al.(1989)은 유방암 환자 24명을 대상으로 10주간 주 3회 60~85 %HRmax의 강도로 자전거 에르고미터를 20~30분 동안 실시한 결과 운동군의 경우 제지방량이 유의하게 증가하였고 체지방률은 유의하게 감소하였다고 보고하였으며, Burnham & Wilcox(2002)도 유방암 환자 15명을 대상으로 10주간 주 3회, 저·중등도의 강도로 트레드밀, 자전거, 계단 오르기를 14~32분 동안 실시한 결과 운동군의 체지방률은 유의하게 감소하였으나 통제군은 유의하게 증가하였다고 보고하였다. 이는 본 연구와 유사한 결과로서 본 연구에서 실시한 유산소 운동은 유리지방산(FFA)이 저장된 지방으로부터 동원되어 근수축의 에너지로 이용되었기 때문에 체지방률이 감소되었다고 생각된다. 또한 근력 운동은 유산소 운동만큼 많은 칼로리를 소비하지 못하지만 근육량을 유지 또는 증가 시키므로 탄력 밴드 운동이 저항성 운동으로서 그 역할을 충분히 하여 제지방량이 높게 나타났다고 생각된다(국민체육진흥공단 체육과학연구원, 2005).

건강체력 요소(심폐지구력, 유연성 및 근지구력)의 변화를 살펴 본 선행연구에서 채영란(2000)은 유방암 환자를 대상으로 상지운동(체스트 프레스, 변형 팔굽혀 펴기, 아령운동)과 걷기운동(40~60 % HRmax)을 1회 20~30분, 8주간 실시한 결과 최대산소섭취량과 최대운동지속시간이 증가하였고, 측관절의 외전, 신전 및 굴곡의 가동범위가 유의하게 증가하였다고 보고하였으며, 유방암 절제술 후 방사선요법을 받고 있는 환자를 대상으로 6주간, 주 3회, 25분간, HRmax 60~80 %의 탄성밴드를 이용한 유산소운동을 실시한 연구에서 견관절 가동성과 장좌위 체전굴 및 등 뒤로 두 손 당기가 운동군 15명과 대조군 11명 두 군 간에 유의한 차이가 나타났다(So et al., 2007). 또한 최근 유방암 절제술 환자를 대상으로 한 연구에서 김양숙과 김미숙(2008)은 1년간의 복합운동 후 기능적 체력 요소 중 좌전굴, 악력, 윗몸일으키기에서 시기간에 유의한 향상을 보였다고 보고하였다. 이와 같이 대부분의 선행연구들에서 유방암 환자들을 대상으로 운동을 실시하여 체력이 향상됨을 알 수 있었고 본 연구에서

도 선행연구와 같은 긍정적인 결과가 나타났다.

이와 같이 긍정적인 결과가 나타난 것은 본 연구에서 실시한 운동 프로그램이 유산소 운동시 음악을 사용하여 율동적인 동작을 실시함으로써 대상자들에게 운동을 지루하게 생각하지 않고 흥미있게 할 수 있었다. 또한 덤벨 및 아령 등을 이용한 일반적인 근력 운동이 아닌 탄력밴드의 사용은 상지기능이 비교적 용이하지 못한 유방암 환자에게 있어서 강도의 조절이 쉽고 부상에 대한 부담감 또한 줄어듦으로써 운동의 효과가 극대화 된 것으로 생각된다. 따라서 유방암 생존자의 체력 향상을 위해 본 연구에서 실시한 유산소 운동과 탄력 밴드를 이용한 근력운동 프로그램을 권장한다.

2. 혈중 렙틴 및 인슐린 농도의 변화

렙틴은 체내 대부분의 세포에 수용체가 분포하여 중추신경계뿐 아니라 말초신경계에서도 다양한 생리기능을 나타낸다(Harvey & Ashford, 2003).

최근 연구에서 렙틴은 유방암 발생과정과 관련이 있으며(Okumura et al., 2002; Cleary et al., 2003), Ishikawa et al.(2004)은 정상 및 악성 유방상피세포에서 특이 항체를 이용한 면역조직화학검사로 렙틴과 그 수용체를 확인 할 수 있었고 렙틴과 그 수용체 모두 정상 상피세포에서 보다 악성세포에서 유의하게 발현이 높게 나타났다고 보고하였다.

또한 렙틴은 비만 및 체지방량과 밀접한 관계가 있는 것으로 알려져 있다(Banks, 2004). 비만인의 렙틴 농도가 높은 것은 증가된 지방량과 지방조직으로부터 증가된 렙틴 분비 모두와 관련이 있다고 하였다(Hamilton et al., 1995; Kolaczynski et al., 1996; Kolaczynski et al., 1996).

지방세포가 암을 유발하는 또 하나의 가능성으로는 비만에 의한 인슐린 분비의 증가를 들 수 있는데, 비만과 당뇨병이 암의 위험을 증가시킨다는 주장이 제기되면서 암 발생 기전과의 관련성이 제기되었다(Calle & Kaaks, 2004; Kominou et al., 2003). 인슐린의 생리적, 생화학적 분자 수준의 작용은 아직 완전히 이해되지 못하고 있으나, 인슐린의 생산이 증가하는 것은 사실상 암 발생과정에서 흔히 볼 수 있는 현상이며, 인슐린이 암의 형성과정에 관여한다는 것은 분명한 것으로 보인다(지선하, 2005). 또한 인슐린 저항성이 암 발생 뿐만 아니라 암환자의 치료 경과에도 나쁜 영향을 미칠 수 있다고 보고하였다(보건복지부, 2006).

이와 관련된 선행연구들을 살펴보면, 유방암 환자 90명, 양성 유방질환 환자 40명 그리고 건강한 대상자 103명을 대상으로 혈청 렵틴, 인슐린 농도를 분석한 결과 양성 유방 질환자와 건강한 대상자보다 유방암 환자에서 혈청 렵틴과 인슐린의 농도가 높게 나타났다고 보고되었으며(Han et al., 2005), 고농도 인슐린은 폐경 후 유방암 생존자의 재발위험이 2배, 그리고 사망 위험은 3배 증가된다고 하였다(Goodwin et al., 2002). 비정상적인 렵틴과 인슐린 농도는 유방암의 발생 뿐만 아니라 재발 및 사망의 위험 증가와 관련이 있다는 것을 알 수 있으며 유방암 환자들의 비만 예방 및 치료와 더불어 렵틴과 인슐린 농도를 조절하기 위한 적절한 중재가 요구된다. 그 중 하나의 방법이 운동이라고 하겠다.

운동은 에스트로겐 분비를 줄여 유방암의 위험을 간접적으로 낮추는 것으로 알려져 있다(<http://www.ehealthmd.com>). The Nurses' Health Study에서도 유방암 발병 이후에 적어도 주당 3시간 정도의 적당한 신체활동을 하는 유방암 환자들이 비활동적인 암환자에 비해 암의 재발과 사망의 위험이 40~50 % 정도 낮아지는 것으로 보고하였다(Holmes et al., 2005). 또한 최근 역학 연구 결과들은 신체 활동을 하는 여성들과 좌식생활을 하는 여성들을 비교해 보았을 때 신체활동을 하는 것이 유방암에 대한 위험을 줄여준다고 하였다(Gammon et al., 1998; Friedenreich & Orenstein, 2002; McTiernan et al., 2003).

따라서 이들에게 신체활동을 높이는 것은 체력을 향상시켜 줄 뿐만 아니라 체지방률의 감소와 함께 인슐린 및 렵틴의 농도에 긍정적인 변화를 일으키므로 유방암의 위험을 감소시켜 줄 수 있을 것으로 생각된다.

본 연구의 결과 렵틴은 운동군과 통제군 모두 감소하였으나 운동군에서만 유의한 차이가 나타났고, 12주 운동 후 운동군과 통제군간에 유의한 차이가 나타났다. 이러한 결과와 관련된 선행연구들은 규칙적인 운동에 의해 렵틴의 농도가 감소되는 것으로 보고하였으며(Pérusse et al., 1997; Hickey et al., 1997; Kohrt et al., 1996; Pasman et al., 1998), 렵틴 농도의 감소가 지방량의 감소와 관련이 있기 때문에 장기간의 운동이 필요하다고 주장하였다(Dirlewanger et al., 1999; Weltman et al., 2000).

유방암 환자를 대상으로 실시한 본 연구를 통해 운동 후 체지방률의 감소와 함께 렵틴의 감소가 나타났는데 유방암

환자를 대상으로 운동과 렵틴에 대한 선행연구가 없기 때문에 직접 논할 수는 없지만 이와 관련된 유사한 연구들의 결과를 토대로 하여 몇 가지 기전을 추정해 볼 수 있다.

첫째, 렵틴 농도의 감소가 지방량의 감소와 관련(Dirlewanger et al., 1999)되어 있기 때문에 지방량이 감소함에 따라 렵틴의 농도 또한 감소된 것으로 생각되며 둘째, 운동이라고 하는 에너지 소비적 활동이 직접적으로 렵틴의 합성과 분비를 감소시키고(Hickey et al., 1996), 마지막으로 운동이 에너지 소비를 유도함으로써 FFA를 TG로 합성하는 비율을 억제함과 동시에 지방 분해 과정을 촉진하는 역할을 한다(Flier, 1997)는 기전에 의해 나타난 결과라 사료된다. 그런데 아직까지 유방암 환자를 대상으로 운동에 의한 렵틴 농도의 변화에 대한 연구결과가 보고되지 않았지만 보다 많은 암환자를 대상으로 운동에 의한 렵틴 농도의 변화에 대해 추후 실험 연구에서 명확한 기전을 밝힐 필요가 있다고 사료된다.

다음으로 인슐린 농도는 운동군의 경우 12주 운동 후 감소하였으나 통제군의 경우 증가하였고 12주 운동 후 운동군과 통제군간에 유의한 차이가 나타났다.

일반인을 대상으로 근력운동과 유산소 운동을 실시한 연구 결과들을 보면 운동은 인슐린 농도를 유의하게 감소시키고, 인슐린 민감성은 유의하게 상승시키는 것으로 보고되었으나(Craig et al., 1989; Kirwan et al., 1993; Miller et al., 1994) 유방암 환자를 대상으로 운동을 중재하여 인슐린 농도의 변화에 대해 연구된 자료가 많지 않다.

Fairey et al.(2003)는 무선 표집한 53명의 유방암 생존자들을 대상으로, 15주 동안 에르고미터를 최대소섭취량의 70~75 %의 강도로 15~35분 동안 실시한 결과 15주 후에 운동군과 통제군 인슐린 농도가 증가하는 경향이 나타났고, 두 그룹 모두 인슐린 농도 변화에 대해 유의차가 나타나지 않았다고 보고한 반면 최근 Ligibel et al.(2008)은 101명의 좌업생활을 하는 과체중 유방암 생존자들을 대상으로 16주간 유산소 운동(주당 90분, 55~80 % HRmax의 강도)과 근력운동을 포함한 복합운동을 실시한 결과 운동군의 경우 공복 인슐린 농도가 평균 2.86 microU/mL 감소되었으나 통제군은 유의한 차이가 없었으며 운동군과 통제군과의 집단간에 유의한 차이가 나타나지 않았고 보고하였다.

본 연구의 결과는 선행연구 중 후자와 같은 결과가 나타났다. 이는 운동의 형태에 있어 유산소 운동의 단독실시와 유

산소운동과 근력운동을 병행한 복합운동의 실시에 따른 차이 때문이라고 생각된다. 즉, 본 연구에서 근력운동으로 실시한 밴드운동이 골격근을 증가시켜 글루코스-인슐린 기능 관계가 개선되어 인슐린 감수성이 증가되는 효과와 더불어, 유산소 운동으로 증가된 심폐체력과 비례하여 세포내 인슐린 수용체의 수적 증가와 골격근의 적응력이 향상되는 등의 효과(국민체육진흥공단 체육과학연구원, 2005)들이 함께 작용하여 나타난 결과라 사료된다. 그리고 또 다른 이유로는 운동으로 인하여 인슐린 감수성이 증가되고 C-peptide의 감소와 글루카곤을 증가시켜 인슐린 농도가 감소된다는(Krotkiewski et al., 1984; Regensteiner et al., 1991)기전 등에 의한 결과라 생각된다. 하지만 현재 유방암 환자를 대상으로 운동과 관련하여 인슐린 농도의 변화에 대한 연구가 매우 부족하기 때문에 추후 보다 많은 유방암 환자를 대상으로 여러 가지 운동 형태 및 강도를 적용한 구체적인 연구가 이루어져야 할 것으로 생각된다.

V. 결 론

본 연구에서 유방암 환자를 대상으로 실시한 12주간의 복합운동이 건강관련 체력과 렙틴 및 인슐린 농도의 변화에 미치는 영향을 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

운동군의 경우는 제지방량($p<.05$), 심폐지구력($p<.01$), 유연성($p<.05$), 근지구력($p<.01$)이 유의하게 증가하였고, 렙틴($p<.001$)과 인슐린($p<.05$) 농도가 유의하게 감소하였으나 통제군은 유의한 차이가 나타나지 않았다. 그리고 12주 운동 후 운동군과 통제군간의 집단간 차이를 검정한 결과는 심폐지구력($p<.05$), 유연성($p<.001$), 근지구력($p<.001$), 렙틴($p<.01$) 그리고 인슐린($p<.05$)의 농도에 있어서 유의한 차이가 나타났다.

이상의 결과를 정리해 보면 본 연구에서 실시한 12주간의 유산소 운동과 탄력밴드를 이용한 근력운동이 유방암 환자의 건강관련 체력과 렙틴, 인슐린의 변화에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 본 연구에서 실시한 운동프로그램은 유방암 환자의 비만을 예방·개선시키고 체력 및 건강의 유지·증진을 통해 이들의 암 재발 방지 및 생존율 증가와 나아가서는 삶의 질 향상을 위한 운동 프로그램의 기초자료로 유용하게 사용될 수 있을 것이라 사료된다.

참 고 문 헌

- 국립 암 센터. (2007). <http://www.ncc.re.kr/index.jsp>
- 국민체육진흥공단 체육과학연구원. (2005). 전문가를 위한 최신 운동처방론(3판). 서울: 도서출판 21세기교육사, 264~265, 319.
- 김양숙, 김미숙 (2008). 유방암 생존자의 장기간 복합 운동 중재에 따른 기능적 체력과 골밀도의 변화. 생명과학회지, 18(7): 968-973.
- 김종엽, 신현원, 정인경, 조성취, 민선정, 이성진, 박철영, 오기원, 홍은경, 김현규, 김두만, 유재명, 임성희, 최문기, 유형준, 박성우. (2005). 비만도에 따른 Adiponectin, Leptin, Ghrelin과 인슐린 저항성, 심혈관 위험인자의 상호 연관성. 대한내과학회지, 69(6): 631-641.
- 보건복지부(2007). 암 통계
- 보건복지부(2006). 암의 원인인 흡연, 음주, 인슐린저항성 등이 암환자의 예후(prognosis)에도 치명적. 보건복지부
- 이동현 (2007). 렙틴(leptin)의 신호전달경로 및 암과의 관련성. 부인종양, 제 18권 제 2호.
- 지선하 (2005). 인슐린 저항성과 암 발생, 그리고 노화. 대한임상노인의학회 춘계학술대회집, 6(1): 19-25.
- 채영란 (2000). 유방암 수술후 방사선 치료중인 환자를 위한 운동프로그램이 신체기능 및 자연살해세포의 활성화에 미치는 효과. 미간행 박사학위논문. 서울대학교 대학원.
- Banks, W. A. (2004). The many lives of leptin. Peptides, 25: 331-8.
- Belfiore, A., Frittitta, L., Costantino, A., Frasca, F., Pandini, G., Sciacca, L., Goldfine, I. D., & Vigneri, R. (1996). Insulin receptors in breast cancer. Ann. N.Y. Acad. Sci. 784:173-188.
- Blanchard, C. M., Courneya, K. S., & Laing, D. (2001). Effects of acute exercise on state anxiety in breast cancer survivors. ONE, 28(10): 1617-1621.
- Boden, G, Chen, X, Kolaczynski, J. W., & Polasky, M. (1997). Effects of prolonged hyperinsulinemia on serum leptin in normal human subject. J Clin Invest. 100:1107-13.

- Burnham, T. R., & Wilcox, A. (2002). Effects of exercise on physiological and psychological variables in cancer survivors. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 34, 1863-1867.
- Calle, E. E., & Kaaks, R. (2004). Overweight, obesity and cancer: epidemiological evidence and proposed mechanisms. *Nat Rev Cancer*, 4(8): 579-591.
- Cleary, M. P., Phillips, F. C., Getzin, S. C., Jacobson, T. L., Jacobson, M. K., Christensen, T. A., et al. (2003). Genetically obese MMTV-TGF α /Lep(ob) Lep(ob) female mice do not develop mammary tumors. *Breast Cancer Res Treat*, 77: 205-15.
- Considine, R. V., Sinha, M. K., & Heiman, M. L. (1996). Serum immunoreactive leptin concentration in normal-weight and obese humans. *N Engl J Med*. 334:292-295.
- Craig, B. W., Everhart, J., & Brown, R. (1989). The influence of high-resistance training on glucose tolerance in young and elderly subjects. *Mechanisms of Ageing and Development*, 49(2), 147-157.
- Cusin, I., Sainsbury, A., Doyle, P., Rohner-Jeanrenaud, F., & Jeanrenaud, B. (1995). The ob gene and insulin. A relationship leading to clues to the understanding of obesity. *Diabetes*. 44:1467-1470.
- Dirlwanger, M., Di Vetta, V., Giusti, V., Schneider, P., Jéquier, E., & Tappy, L. (1999). Effect of moderate physical activity on plasma leptin concentration in humans. *European journal of applied physiology and occupational physiology*, 79(4): 331-335.
- Fairey, A. S., Courneya, K. S., Field, C. J., Bell, G. J., Jones, L. W., & Mackey, J. R. (2003). Effects of exercise training on fasting insulin, insulin resistance, insulin-like growth factors, and insulin-like growth factor binding proteins in postmenopausal breast cancer survivors: a randomized controlled trial. *Cancer epidemiology, biomarkers & prevention*, 12(8): 721-727.
- Flier, J. S. (1997). Leptin expression and action: new experimental paradigms. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 94(9): 4242-4245.
- Friedenreich, C. M., & Orenstein, M. R. (2002). Physical activity and cancer prevention: Etiologic evidence and biological mechanisms. *The Journal of nutrition*, 132(11): 3456S-3464S.
- Friedenreich, C. M. (2001). Physical activity and cancer prevention: from observational to intervention research. *Cancer Epidemiol. Biomarker Prev.*, 10: 287-391.
- Gammon, M. D., John, E. M., & Britton, J. (1998). Recreational and occupational physical activities and risk of breast cancer. *Journal of the National Cancer Institute* 90(2), 100-117.
- Giovannucci, E. (1995). Insulin and colon cancer. *Cancer Causes Control*. 6(2):164-79.
- Goodwin, P. J., Ennis, M., Pritchard, K. I., Trudeau, M. E., Koo, J., Madarnas, Y., Hartwick, W., Hoffman, B., & Hood, N. (2002). Fasting insulin and outcome in early-stage breast cancer, results of a prospective cohort study. *J. Clin. Oncol*. 20(1):42-51.
- Haffner, S. M., Stern, M. P., Miettinen, H., Wei, M., & Gingerich, R. L. (1996). Leptin concentrations in diabetic and nondiabetic Mexican-Americans. *Diabetes*. 45:822-824.
- Hamilton, B. S., Paglia, D., Kwan, A. Y., & Deitel, M. (1995). Increased obese mRNA expression in omental fat cells from massively obese humans. *Nature medicine*, 1(9), 953-956.
- Han, C., Zhang, H. T., Du, L., Liu, X., Jing, J., Zhao, X., Yang, X., & Tian, B. (2005). Serum levels of leptin, insulin, and lipids in relation to breast cancer in China. *Endocrine*, 26(1): 19-24.
- Harvey, J., & Ashford, L. J. (2003). Leptin in the CNS: Much more than a satiety signal. *Neuropharmacology*, 44: 845-54.

- Hassink, S. G., Sheslow, D. V., De L. E., Opentanova, I., Considine, R. V., & Caro, J. F. (1996). Serum leptin in children with obesity: relationship to gender and development. *Pediatrics*, 98:201-203.
- Hickey, M. S., Considine, R. V., Israel, R. G., Mahar, T. L., McCammon, M. R., Tyndall, G. L., Houmard, J. A., & Caro, J. F. (1996). Leptin is related to body fat content in male distance runners. *The American journal of physiology* 271(5 Pt 1): E938-940.
- Hickey, M. S., Houmard, J. A., Considine, R. V., Tyndall, G. L., Midgeff, J. B., Gavigan, K. E., Weidner, M. L., McCammon, M. R., Israel, R. G., & Caro, J. F. (1997). Gender-dependent effects of exercise training on serum leptin levels in humans. *American Journal of Physiology*, 272: E562-6.
- Hladiuk, M., Huchcroft, S., Temple, W., & Schnurr, B. E.(1992). Arm function after axillary dissection for breast cancer: a pilot study to provide parameter estimates. *Journal of surgical oncology*, 50(1), 47-52.
- Holmes, M. D., Chen, W. Y., Feskanich, D., Kroenke, C. H., & Colditz, G. A.(2005). Physical activity and survival after breast cancer diagnosis. *Obstetrical & gynecological survey*, 6(12), 798-800.
- <http://www.ehealthind.com>. Retrieved Oct 21, 2008, Available from : URL : <http://www.ehealthind.com>
- Irwin, M. L., McTiernan, A., Bernstein, L., Gilliland, F. D. Baumgartner, R., Baumgartner K., & Ballard-Barbash, R.(2005). Relationship of Obesity and Physical Activity with C-Peptide, Leptin, and Insulin-Like Growth Factors in Breast Cancer Survivors. *Cancer epidemiology, biomarkers & prevention*. 14(12):2881 - 2888.
- Ishikawa, M., Kitayama, J., & Nagawa, H. (2004). Enhanced expression of leptin and leptin receptor (OB-R) in human breast cancer. *Clin Cancer Res*, 10: 4325-31.
- Kaaks, R. (1996). Nutrition, hormones, and breast cancer: is insulin the missing link? *Cancer Causes Control*. 7(6):605-25.
- Kaaks, R., Lukanova, A., & Kurzer, M. S. (2002). Obesity, endogenous hormones, and endometrial cancer risk: a synthetic review. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 11(12):1531-43.
- Kellerer, M., Lammers, R., Fritsche, A., et al. (2001). Insulin inhibits leptin receptor signalling in HEK293 cells at the level of janus kinase-2: a potential mechanism for hyperinsulinaemia-associated leptin resistance. *Diabetologia*. 44:1125-1132.
- Kelley, D. E., & Goodpaster, B. H.(1999). Effects of physical activity on insulin action and glucose tolerance in obesity. *Medicine and science in sports and exercise*. 31(11):S619-S623.
- Kirwan, J. P., Kohrt, W. M., Wojta, D. M., Bourey, R. E., & Holloszy, J. O.(1993). Endurance exercise training reduces glucose-stimulated insulin levels in 60-70 year old men and women. *Journal of gerontology*. 48:M84-M90.
- Kohrt, W. M., Landt, M., & Brige, S. J.(1996). Serum leptin levels are reduced in response to exercise training, but not hormone replacement therapy, in older women. *The Journal of clinical endocrinology and metabolism*, 81, 3980-3985.
- Kolaczynski, J. W., Nyce, M. R., Considine, R. V., & Boden, G, et al. (1996). Acute and chronic effect of insulin on leptin production in human: Studies in vivo and in vitro. *Diabetes*. 45:699-701.
- Kolaczynski, J. W., Considine, R. V., Ohannesian, J., Marco, C., Opentanova, I., Nyce, M. R., Myint, M., & Caro, J. F.(1996). Responses of leptin to short-term fasting and refeeding in humans: A link with ketogenesis but not ketones themselves. *Diabetes*, 45(11), 1511-1515.
- Kolaczynski, J. W., Ohannesian, J. P., Considine, R. V., Marco, C. C., & Caro, J. F.(1996). Response of

- leptin to short-term and prolonged overfeeding in humans. *The Journal of clinical endocrinology and metabolism*, 81(11), 4162-4165.
- Komninou, D., Ayonote, A., Richie, J. P. jr, & Rigas, B. (2003). Insulin resistance and its contribution to colon carcinogenesis. *Exp Biol Med (Maywood)*. 228(4):396-405.
- Krotkiewski, M., Björntorp, P., Holm, G., Marks, V., Morgan, L., Smith, U., & Feurle, G. E.(1984). Effects of physical training on insulin, connecting peptide (C- peptide), gastric inhibitory polypeptide (GIP) and pancreatic polypeptide (PP) levels in obese subjects. *International journal of obesity*. 8(3):193-199.
- Ligibel, J. A., Campbell, N., Partridge, A., Chen, W. Y., Salinardi, T., Chen, H., Adloff, K., Keshaviah, A., & Winer, E. P. (2008). Impact of a mixed strength and endurance exercise intervention on insulin levels in breast cancer survivors. *Journal of clinical oncology*, 26(6): 907-912.
- McTiernan, A. (2004). Physical activity after cancer: physiologic outcomes. *Cancer investigation*, 22(1): 68- 81.
- McTiernan, A., Kooperberg, C., White, E., Wilcox, S., Coates, R., Adams- Campbell, L. L., Woods, N., & Ockene, J. (2003). Recreational physical activity and the risk of breast cancer in postmenopausal women. *JAMA*, 290(10): 1331-1336.
- McTiernan, A., Kumai, C., Bean, D., Hastings, R., Schwartz, R., Ulrich, N., Gralow, J., Potter, J. (1998) Anthropometric and hormone effects of an 8-week exercise-diet intervention in breast cancer patients, results of a feasibility pilot study. *Cancer Epidemiol. Biomark. Prev.* (7):447-481.
- Miller, J. P., Pratley, R. E., Goldberg, A. P., Gordon, P., Rubin, M., Treuth, M. S., Ryan, A. S., & Hurley, B. F.(1994). Strength training increases insulin action in healthy 50-65 year old men. *Journal of applied physiology*. 77(3): 1122-1127.
- Niskanen, L. K., Haffner, S., Karhunen, L. J., Turpeinen, A. K., Miettinen, H., & Uusitupa, M. I. (1997). Serum leptin in obesity is related to gender and body fat topography but does not predict successful weight loss. *European journal of applied physiology*, 137(1): 61-7.
- O'Brien, S. N., Welter, B. H., & Price, T. M. (1999). Presence of leptin in breast cell lines and breast tumors. *Biochemical and biophysical research communications*, 259(3): 695-698.
- Okumura, M., Yamamoto, M., Sakuma, H., Kojima, T., Maruyama, T., Jamali, M., et al. (2002). Leptin and high glucose stimulate cell proliferation in MCF-7 human breast cancer cells: Reciprocal involvement of PKC-alpha and PPAR expression. *Biochim Biophys Acta.*, 1592: 107-16.
- Oliveria, S. A., & Christos, P. J. (1997). The epidemiology of physical activity and cancer. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 29: 79-90.
- Papa, V., & Belfiore, A. (1996). Insulin receptors in breast cancer. Biological and clinical role. *J.Endocrinol.Invest.* 19:324-333.
- Pasman, W. J., Westerterp-Plantenga, M. S., & Saris, W. H. M.(1998). The effect of exercise training on leptin levels in obese males. *American Journal of Physiology*, 37(2), E280-E286.
- Pérusse, L., Collier, G., Gagnon, J., Leon, A. S., Rao, D. C., Skinner, J. S., Wilmore, J. H., Nadeau, A., Zimmet, P. Z., & Bouchard, C. (1997). Acute and chronic effects of exercise on leptin levels in humans. *Journal of applied physiology*, 83(1): 5-10.
- Regensteiner, J. G., Mayer, E. J., Shetterly, S. M., Eckel, R. H., Haskell, W. L., Marshall, J. A., Baxter, J., & Hamman, R. F.(1991). Relationship between habitual physical activity and insulin levels among nondiabetic men and women. San Luis Valley Diabetes Study. *Diabetes Care*. 14(11):1066-1074.
- Renehan, A. G., & Howell, A. (2005) . Preventing cancer, cardiovascular disease, and diabetes.

Lancet. 365(9469):1449-51.

- Rose, D. P., Gilhooly, E. M., & Nixon, D. W.(2002). Adverse effects of obesity on breast cancer prognosis, and the biological actions of leptin (review). *International Journal of Oncology*. 21(6):1285-1292.
- So, H. S., Noh, Y. H. Seo, N. S. Kim, H. Y., & Ko, E. (2007). Effects of aerobic exercise using a flex-band on a cardiorespiratory function and physical flexibility of breast cancer women undergoing radiation therapy. *Global breast cancer conference*, 269-270.
- Thune, I., & Furberg, A. S. (2001). Physical activity and cancer risk; dose response and cancer, all sites and site-specific. *Med. Sci. Sports Exerc.*, 33: S609-610.
- Weiderpass, E., Partanen, T., Kaaks, R., Vainio, H., Porta, M., & Kauppinen, T., et al. (1998). Occurrence, trends and environment etiology of pancreatic cancer. *Scand J Work Environ Health*. 24(3):165-74
- Weltman, A., Pritzlaff, C. J., Wideman, L., Considine, R. V., Fryburg, D. A., Gutgesell, M. E., Hartman, M. L., & Veldhuis, J. D.(2000). Intensity of acute exercise does not alter serum leptin concentrations in young men. *Medicine and science in sports and exercise*, 32(9), 1556-1561.
- Winningham, M. L., MacVicar, M. G., Bondoc, M., Anderson, J. I., Minton, J. P. (1989). Effect of aerobic exercise on body weight and composition in patients with breast cancer on adjuvant chemotherapy. *Oncol. Nurs. Forum*16(5):683-689.